


# Ooglidcorrectie



**“Elke wens verdient respect!”**

Arthur Ludlage, arts/directeur MediConsult



MediConsult is een particuliere kliniek die uw wensen op esthetisch gebied serieus neemt en het natuurlijk vindt dat u streeft naar uw ideale uiterlijk. Met goede voorlichting, een uitstekende behandeling en veel persoonlijke aandacht staat MediConsult voor een optimale kwaliteit van zorg, zoals bij het corrigeren van uw oogleden.

De medische term voor ooglidcorrectie is **blepharoplastiek**. Deze term is aan het Grieks ontleend en betekent, vrij vertaald, ‘modelleren van de oogleden’.

## Wanneer een ooglidcorrectie?

Bij oogleden kunnen zich verschillende problemen voordoen. De belangrijkste zijn wallen onder de ogen en huidoverschot bij boven- en/of onderoogleden. Bij veel mensen komen beide problemen overigens in combinatie voor.

## Wallen


Wallen zijn verdikkingen van de onderoogleden, waardoor het gezicht een vermoeide, slecht uitgeslapen indruk kan maken. De meest voorkomende oorzaak van wallen is de plaatselijke aanwezigheid van overtollig vetweefsel. Rond het oog liggen meerdere vetpockets, die het oog in de oogkas beschermen. Sommige mensen hebben echter een familiale aanleg voor een overmatige hoeveelheid vet in deze pockets. Dit vet kan gaan uitpuilen in de oogleden en dat is soms al op jonge leeftijd zichtbaar.

Op oudere leeftijd kunnen ook normale hoeveelheden vet in de oogleden gaan uitpuilen. Omdat dit vetweefsel vrij gemakkelijk vocht vasthoudt, kan de ernst van de wallen nogal eens wisselen. Met name 's ochtends bij het opstaan en bij vermoeidheid kun-

nen de onderoogleden sterk zijn opgezwollen. Zijn de wallen erg fors of vaak gezwollen, dan bestaat op den duur het risico dat de huid van de oogleden wordt uitgerekt.

## Huidoverschot

Met het vorderen van de leeftijd wordt de ooglidhuid slapper en dunner, maar ook aanleg kan hierbij een rol spelen. Door het verslappen en dunner worden kan bij boven- en onderoogleden een huidoverschot ontstaan.



Bij de bovenoogleden wordt dit zichtbaar door het overhangen van de huid. In het begin is alleen een extra plooi zichtbaar, maar als het erger wordt kan de huid zelfs over de wimpers heen gaan hangen waardoor het kijken wordt bemoeilijkt. Veel mensen met dit probleem hebben snel het gevoel van vermoeide ogen of moeten zelfs continu de wenkbrauwen optrekken om beter te kunnen zien. In sommige gevallen wordt de extra huidplooi in de bovenoogleden niet veroorzaakt door huidoverschot, maar door het ‘hangen’ van wenkbrauwen of voorhoofd. In dergelijke gevallen kan een wenkbrauwlift of een voorhoofds- lift de juiste oplossing zijn. Bij de onderoogleden resulteert


# Ooglidcorrectie

“Een langdurig resultaat”

huidoverschot in rimpels. In sommige gevallen zijn zelfs ‘zakjes’ overtollige huid zichtbaar.

## De operatie

Ooglidcorrectie vindt plaats onder lokale anesthesie. De aanpak van wallen en van huidoverschot is grotendeels dezelfde. Voor de onderoogleden wordt een sneetje gemaakt juist onder de wimpers, waardoor het littekentje later nauwelijks te zien is. Voor de bovenoogleden wordt het sneetje grotendeels in de natuurlijke plooi van het bovenooglid gemaakt, zodat bij geopende ogen nagenoeg geen littekentje zichtbaar is. Nadat de weefsels voorzichtig zijn geopend, wordt het overtollige vet en/of het overtollige spier- en huidweefsel weggenomen. Vervolgens wordt de huid met heel fijne




correctie bovenoogleden

hechtingen gesloten. Het wegnemen van een vetophoping bij de onderoogleden kan in een enkel geval ook plaatsvinden via de binnenzijde van de oogleden. In dat geval blijft er geen littekentje achter.

## Na de operatie

Vrijwel iedereen krijgt na een ooglidcorrectie te maken met gezwollen, blauwe oogleden. Om dit zoveel mogelijk onder controle te houden wordt u na de ingreep enkele uren op bed gelegd met ijskompresen op de ogen. Ook adviseren wij u dit



de eerste 24 uur met tussenpozen thuis vol te houden. Na vijf tot zeven dagen worden de hechtingen verwijderd. Na ongeveer één week zijn de zwelling en blauwe verkleuring doorgaans verdwenen en kunt u ook weer make-up gebruiken. Bij correctie van het onderooglid kunt u na ongeveer één week weer contactlenzen dragen; bij correctie van het bovenooglid kan dit alweer na een dag.

## Risico's en complicaties

Bij ooglidcorrecties is de kans op infectie erg klein. Weliswaar kunnen vrij forse zwellingen en bloeditstoringen ontstaan, maar die zijn altijd van tijdelijke aard. Op de plekjes waar hechtmateriaal heeft gezeten kunnen soms ‘gerstekorreltjes’ ontstaan. Wanneer deze niet vanzelf verdwijnen kunnen ze eenvoudig worden verwijderd. Sommige cliënten hebben na de ingreep last van tranende of juist droge ogen, maar dit is na enkele weken voorbij. Een enkele keer kan het ooglid tijdelijk wat afstaan, doordat het littekentje zolang het niet genezen is nog hard is. Over het algemeen herstelt zich dit vrij snel.

